🗂️ Fiches de révision

Fiche de révision : les préfixes en terminologie médicale

Absence, excès, quantité

PRÉFIXE	SENS	EXEMPLE
a-, an-	absence, privation (gr.) ; *an-* devant une voyelle	*aphasie* : perte du langage ; *anurie* : absence d'urine
dys-	difficulté, anomalie (gr.)	*dysurie* : miction difficile
hypo-	sous, en dessous, insuffisance (gr.)	*hypoglycémie* : taux de sucre sanguin trop bas
hyper-	au-dessus, excès (gr.)	*hypertension* : tension artérielle trop élevée
poly-	nombreux, abondant (gr.)	*polyurie* : urines trop abondantes
oligo-	peu, peu nombreux (gr.)	*oligurie* : diminution du volume des urines
hémi-	moitié (gr.)	*hémiplégie* : paralysie d'une moitié du corps
pan-	tout, totalité (gr.)	*pancytopénie* : baisse de toutes les lignées sanguines
anti-	contre (gr.)	*antibiotique*, *antalgique* (contre la douleur)

Position et direction

PRÉFIXE	SENS	EXEMPLE
endo-	à l'intérieur, dedans (gr.)	*endoscopie* : examen de l'intérieur d'un organe
exo-	hors de, à l'extérieur (gr.)	*exophtalmie* : saillie anormale de l'œil hors de l'orbite
péri-	autour (gr.)	*péricarde* : enveloppe autour du cœur
épi-	sur, au-dessus (gr.)	*épiderme* : couche superficielle de la peau
para-	à côté de (gr.)	*parathyroïde* : glande située à côté de la thyroïde
sub-, sous-	sous, en dessous (lat.)	*sublingual*, *sous-cutané* : sous la langue, sous la peau
intra-	à l'intérieur de (lat.)	*intraveineux* : dans la veine
inter-	entre (lat.)	*intercostal* : entre les côtes
rétro-	en arrière, derrière (lat.)	*rétrosternal* : derrière le sternum
trans-	à travers, au-delà (lat.)	*transthoracique* : à travers la paroi du thorax

Temps, vitesse, taille

PRÉFIXE	SENS	EXEMPLE
pré-, anté-	avant (lat.)	*prénatal* : avant la naissance
post-	après (lat.)	*postopératoire* : après l'opération
néo-	nouveau (gr.)	*néonatal* : qui concerne le nouveau-né
brady-	lent (gr.)	*bradycardie* : rythme cardiaque lent
tachy-	rapide (gr.)	*tachycardie* : rythme cardiaque rapide
macro-	grand (gr.)	*macroscopique* : visible à l'œil nu
micro-	petit (gr.)	*microcéphalie* : tête anormalement petite

À retenir : 3 pièges fréquents

- **hypo- / hyper-** : une seule lettre d'écart, des sens opposés. *Hypoglycémie* ≠ *hyperglycémie* : relisez lettre par lettre avant de valider un courrier.
- **intra- / inter-** : *intra* = à l'intérieur (intraveineux), *inter* = entre (intercostal). Ils ne sont jamais interchangeables.
- **anté- / anti-** : *anté* = avant (antécédent), *anti* = contre (antibiotique). Attention aussi à *a-* qui devient *an-* devant une voyelle (anurie, anémie).

Mini auto-test

1. Que signifie le préfixe *brady-* ? _____
2. Quel préfixe signifie « autour » ? _____
3. Trouvez le terme : diminution du volume des urines. _____
4. « Entre les côtes » se dit-il intracostal ou intercostal ? _____
5. Donnez le contraire d'*hypotension*. _____

Réponses : 1. lent · 2. péri- · 3. oligurie · 4. intercostal · 5. hypertension

Version en ligne, corrigé et autres supports gratuits

medilearn.app/kits-formateur/fiche-revision-prefixes · bibliothèque formateur MediLearn